

植牙替代失落的牙根，最先牙科醫生將植牙體植入牙槽骨裡，經過3-6個月後，以不同情況而定，醫生將栓柱或支台體叩進植體，栓柱突出牙齦提供瓷冠或加移動性假牙的可靠支架。

植牙現在比過去更能幫助患者。植牙能替代失落、變壞、或不能補修的牙齒。植牙也能使您的假牙更能安穩配用。您不再需要髒亂的膠膏來黏住您的假牙。如果要更正確地瞭解您的需要，請徵詢您的牙科醫生。

下面幾種情況下，您可以考慮種牙：

您要求您的義齒更加美觀。

您要求以更有效的方法來恢復/增加您的咀嚼功能。

您不能適應或不願意佩戴活動假牙。

您的活動假牙不能穩定地佩戴及咀嚼食物。

您不願意在採用傳統的固定橋方法修復缺牙時要磨損您的真牙。

您缺失了牙列里最後的一顆和多顆牙，而又希望採用固定的修復。

您缺齒位置的幅度太長，不適合用傳統固定橋的方法來修復。

您缺少牙齒但希望能品嚐您最喜歡的食物，及改善您的外表或說話能力

那麼您應該就是要植牙的人了。

用植牙來修復損害或失落的牙齒常為價格比較便宜、可靠，也比用穿根治療來修復、固定或鑲復省時。

多種選擇帶給您全新的概念：

採用不磨損兩側健康牙齒作基牙的方法來固定您的牙橋，補回您失去的自然牙及牙根。

種植牙是您最好的選擇，您的修復牙橋有了自己的橋基，從而減輕了您鄰近牙的負荷。

局部缺牙

前牙 局部多牙缺

牙

一副全口義齒在短時期內起到效果。但如果没有牙根來保持頷骨的健康，頷骨會慢慢吸收或萎縮，導致義齒失去密合性，產生移位，變得不舒服，同時還將改變您的臉部外形。種植釘與頷骨的癒合，保持了頷骨的健康，更保證了您牙齒的穩固。

下全口缺牙

上全口缺牙

種植牙最大優點：即義齒的活動性，覆蓋義齒連接在一根杆上面，它比傳統的義齒具有更大的穩固性。在許多病例中，覆蓋義齒所需的種植釘比上述全口缺失情況下所需的種植釘要少

如果您在考慮植牙，請諮詢您的牙科醫生關於植牙系統。通常植牙在一小時內完成，您就可以在同一天回家或上班，而僅有一絲微的小疼痛。如果您想要在您的地區找到使用植牙系統之牙科醫生，請來電或E-mail 詢問。

植牙的步驟

植體是用鈦 (Ti) 合金製成，植入牙槽骨裡來替代失落的牙根，其植入通常在診治療程一小時或較短時間內用局部麻醉就可完成或經過2-6個月待癒期後，待癒栓就可以拔除，待之以最終栓柱即入植體，最後齒冠或可動性假牙固定於支台體完成修復。

1. 置入插有待癒栓的植體
2. 帶癒時間大約十週
3. 將待癒栓拔出植體
4. 最後叩入植體
5. 加附齒冠

可以用植體來固定，讓齒齦覆蓋部分，可以移開以求較大的舒適