

小骨钉

PUSAT PERGIGIAN U 优牙科中心 U DENTAL CENTER

Taman U 大学城: 26A, Jalan Kebudayaan 1, Taman Universiti, 81300 SKUDAI. Tel/Fax:607-521 1111, 607-5208508 SMS: 6012-8800100 HP: 6 014-888 9000
 Taman Sentosa 新山大丰: 25A, Jalan Sutera, Taman Sentosa, 80150 Johor Bahru. Tel: 07-333 3000 SMS: 6013-222 3000 HP: 6014-800 2000
 UDA/Tampoi 新山 乌达/淡杯: 39-01, Jalan Padi Emas 1/3, Uda Business Center, Bandar Baru UDA, 81200 Johor Bahru Tel: 607-2 444 666 SMS: 6016-6 800 200 HP: 6016-6 800100
 Taman Molek 百合: 84-01, Jalan Molek 2/2, Taman Molek, 81100, Johor Bahru. Tel: 07- 35 33 222 SMS:6 016-6 300 500 HP: 6019-500 8 500
 Bukit Indah 武吉英达: 65, Jalan Indah 16/12, Taman Bukit Indah, 81200 Johor Bahru, Johor. Tel: 07-232 GIGI, 07-232 4444, SMS:6 014-9 900 900 HP: 6014-888 2000
 Mount Austin 奥士丁: 70-01, Jalan Austin Heights 8/7, Taman Mount Austin, 81100 Johor Bahru. Tel: 607-364 3477 SMS: 6013-500 6 700 HP: 6016-200 4 500
U Dental Specialist Clinic 优牙科专科诊所 Klinik Pakar Pergigian U
 65A, Jalan Indah 16/12, Taman Bukit Indah, 81200 Johor Bahru, Johor. Tel: 607-234 2000 SMS: 6014-508 0000 HP: 6019-500 6 900
 www.gigi.my info@gigi.my

患者告知与知情同意*: 帮助您做出明智的决定

*在您理解一种治疗之前请不要做出决定


什么是骨钉?

骨钉是一种能够植入牙床来帮助移动位置不佳的牙齿。在牙齿矫正(绑牙治疗)扮演着锚的作用。

为什么需要骨钉?

当绑牙过程中移动某颗牙齿的时候,其他的牙齿会扮演锚的效果。但不是每一个情况之都可以用牙齿来做锚,骨钉能够解决这些问题:


- 前牙太突需要后牙很大的支持力
如果后牙不够力将无法完全拉进前牙,前还会有点突出




- 前牙露太多牙肉, 需要把前牙向上按
骨钉提供力的来源解决一些传统绑牙不能做的事情,比如说牙肉露的太多。传统的方法是做手术,但是用了骨钉可以避免手术。



- 前牙咬不完后牙太长, 要把后牙按短一点




- 加力的控制;
如要把后牙推去前面, 但前牙不能向后跑



- 要减少后牙向前斜, 绑牙会完成得比较精精细



- 当前牙中线需要向一侧移动时 - 需要从一侧获得更大的力量



固定是怎么植入牙床呢?

骨钉是在绑牙的阶段植入牙床的. 医生会帮你局部麻醉, 骨钉植入的位置通常是预定在两牙脚的中间。
骨钉会以两种方式植入; 直接植入或先钻小洞再植入. 骨钉植入之后便可以直接使用为锚。

植入骨钉会疼吗?

牙床已经麻醉, 您可能有拉扯/有压力的感觉, 但不应该会有痛。
术后几天可能会有点不舒服, 医生可能医生会给你一些止痛药或抗生素, 以备不时之需,

该如何照顾骨钉?

一天两次在骨钉的周围用牙刷和牙膏轻轻的刷. 不要用舌头或手指来干扰骨钉. 植入骨钉的前几天, 你可以用漱口药来杀菌。
刚植入的时候骨钉会有一些松动, 但如果骨钉被身体排出/脱落的话, 请联络你的牙医, 等牙肉牙骨好一点后再装新骨钉。

植入骨钉什么风险?


骨钉植入的成功率高达70-80%.

通常骨钉在绑牙治疗期间是会稳固的。可能出现的状况如：

- 骨钉可能会碰到牙脚, 但多数情况, 牙脚都不会有问题 而且能顺利康复
- 骨钉会松动, 但也能轻易的把它放回原来的位置
- 1-2% 的骨钉在植入时的尖端会断, 若发生, 一小段的骨钉会被留在骨头。并不会带来很大的问题。
- 20%-30% 所植入的骨钉会松动/失败, 需要再重做
- 发炎-需要把骨钉周围清理干净。

如果不要骨钉, 什么其他方式?

你的牙医会让你知道所能够拉直牙齿和把拉密牙齿的方法。骨钉能让你的治疗更效。其他的方法包括拔牙或接受绑牙之后一点的瑕疵。最终决定决定权是在您的手里。



骨钉会在嘴多久?

- 通常骨钉会在嘴 留着6-12个月的时间
- 到所要达到的位置之后, 就会把骨钉拿掉。

骨钉是怎么被拿掉的?

- 很简单。通常都不需要麻醉。牙床和牙骨都会痊愈的很好。

费用如何?

骨钉大约为RM750/支. 如果有任何原因(例如发炎等等)导致骨钉松了, 医生将会免费做回一支骨枚。如果不打算重新植入, 只需支付半价。
一个绑牙疗程通常至少需要两支骨钉, 费用可以分三期, 在九个月之内付清。

